

CLAMOX RTU

תרחיף להזרקה לבקר, חזירים, כלבים וחתולים.

140/35 מ"ג/מ"ל

הרכב

כל 1 מ"ל מכיל:

חומרים פעילים:

אמוקסיצילין [Amoxicillin], כאמוקסיצילין טריהידראט

[amoxicillin trihydrate]: 140 מ"ג חומצה קלולנית
[Clavulanic acid], כאשלגן קלוולנט [clavulanate]

[potassium]: 35 מ"ג

חומרים לא פעילים:

שמן קוקוס (מיגליול 840 Miglyol)

תרחיף שמנוני, בצבע לבנבן הנוטה לצהוב-חום.

מיני המטרה

בקר, חזירים, כלבים וחתולים

התוויות שימוש

המוצר מותווה לבקר, חזירים, כלבים וחתולים לטיפול

במחלות הבאות שנגרמות על ידי חיידקים שרגשים

לפעולת החומרים הפעילים:

בקר: זיהומים בדרכי הנשימה, זיהומים ברקמות רכות (מורסות, דלקת פרקים), מטריטיס (דלקת רחם), מסטיטיס.

חזירים: זיהומים בדרכי הנשימה, קוליבצילוזיס, זיהומים

בחזירות בסמוך למועד ההמלטה (תסמונת MMA

[מטריטיס, מסטיטיס, אגלקטיה]).

כלבים, חתולים: זיהומים בדרכי השתן, זיהומים בדרכי

הנשימה, זיהומים בעור וברקמות רכות (מורסות, פידורמה,

מורסות בבלוטות פרי-אנאליות, גינגיביטיס).

התוויות נגד

אין להשתמש אם קיימת רגישות יתר לחומר הפעיל או

לאחד או יותר מחומרים הלא פעילים. אין לתת לארנבים,

שרקנים ואוגרים. יש להשתמש בזהירות לטיפול באוכלי

צמחים קטנים אחרים.

אזהרות מיוחדות

אזהרות מיוחדות:

אין.

אמצעי זהירות מיוחדים לשימוש בטוח בחיות המטרה:

יש להשתמש במוצר על סמך בדיקת רגישות החיידקים

לאחר בידוד מבעל החיים.

אם לא ניתן לעשות זאת, יש לבסס את הטיפול על נתונים

אפידמיולוגיים לגבי רגישות החיידקים שהטיפול מיועד

להם.

יש לפעול לפי המדיניות האנטימיקרוביאלית הרשמית,

הלאומית והאזורית בעת השימוש במוצר.

שימוש במוצר באופן שלא תואם להוראות בדף סיכום

מאפייני המוצר עלול להגביר את הסיכון להתפתחות

חיידקים הפעמיים לאמוקסיצילין ולהפחית את יעילות

הטיפול בפניצילינים אחרים בגלל עמידות צולבת אפשרית.

אמצעי זהירות מיוחדים לנקיטה על ידי האדם שנותן את

המוצר התרופותי הווטרנרי לבעלי החיים:

פניצילינים וצפלוספורינים עלולים לגרום לתגובות של

רגישות יתר (אלרגיה) בעקבות הזרקה עצמית, שאיפה,

בלעיה או מגע עם העור.

רגישות יתר לפניצילינים עלולה להיות קשורה לרגישות צולבת לצפלוספורינים, ולהפך.

לעיתים, תגובות אלרגיות לחומרים אלה יכולות להיות חמורות.

במקרה של הזרקה עצמית בשוגג, פנה לקבלת עזרה רפואית והראה את עלון האריזה או את התווית לרופא.

במקרה של מגע מקרי עם העור, יש לשטוף במים וסבון. יש להשתמש במוצר זה בהירות כדי למנוע חשיפה ולנקוט

את כל אמצעי הזהירות. אין להשתמש במוצר זה אם ידוע

לך שאתה רגיש לו או אם הוזהרת שלא להתעסק במוצרים

כאלה. אם אתה מפתח תסמינים בעקבות חשיפה, כגון

פריחה בעור, עליך לפנות לייעוץ רפואי ולהראות לרופא

אזהרה זו. נפחות בפנים, בשפתיים או בעיניים או קושי

בנשימה הם תסמינים חמורים יותר ודורשים טיפול רפואי

דחוף.

היריון:

ניתן להשתמש במוצר בבעלי חיים בתקופת ההיריון

וההנקה.

אינטראקציה עם מוצרים תרופתיים אחרים וצורות

אינטראקציה אחרות:

אין לתת במקביל לאנטיביוטיקה בקטריוסטטית.

מנת יתר:

המוצר התרופותי הווטרנרי בעל רמת רעילות נמוכה ונסבל

היטב במתן פרנטרלי. מלבד תגובות מעת לעת במיקום

ההזרקה, שעלולות להתרחש במנה המומלצת, לא צפויות

השפעות חריגות אחרות כתוצאה ממנת יתר שניתנת

בטעות.

מצבי אי תאימות עיקריים:

בהיעדר מחקרי תאימות, אין לערבב את המוצר התרופתי

הווטרנרי הזה עם מוצרים תרופתיים וטרנריים אחרים.

אירועים חריגים

בקר, חזירים, כלבים וחתולים:

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| נדירים מאוד (>) | כאב במיקום ההזרקה, |
| בעל חיים/10,000 | תגובה במיקום ההזרקה |
| בעלי חיים שטופלו, | תגובה אלרגית ¹ (למשל |
| כולל דיווחים | תגובה אלרגית בעור, |
| בודדים): | אנפילקסיס) |

¹ אם מתרחשת תגובה אלרגית, יש להפסיק את השימוש

במוצר באופן מיידי. יש להתחיל בטיפול סימפטומטי

מתאים.

חשוב לדווח על אירועים חריגים. כך ניתן לנטר את בטיחות

המוצר באופן רציף. אם תבחין בתופעות לוואי כלשהן,

אפילו כאלה שלא נרשמו בעלון האריזה, או אם תהיה

סבור שהתרופה לא השפיעה, הודע בראש ובראשונה

לווטרינר. ניתן גם לדווח על אירועים חריגים לבעל אישור

השיווק באמצעות פרטי הקשר בסוף עלון זה, או באמצעות

מערכת הדיווח הלאומית (farmacovigilenta@ansvs.ro)

(icbmv@icbmv.ro)

המנה עבור כל אחת מחיות המטרה ואופן המתן

ניתן להזריק את המוצר תת-עורית או תוך-שרירית בכלבים וחתולים, ורק בתוך השריר בבקר וחזירים.

המנה היא 8.75 מ"ג חומר פעיל / ק"ג משקל גוף, שווה ערך ל-1 מ"ל מוצר / 20 ק"ג משקל גוף, במתן כל 24 שעות במשך 3 עד 5 ימים רצופים.

טיפול משולב לבקר לטיפול במסטיטיס:

במקרה שבו יש צורך בטיפול מערכתי וגם בטיפול במתן לתוך העיניים, ניתן להשתמש ב-CLAMOX RTU בשילוב עם CLAMOX LC.

טיפול משולב, יש לבצע את משטר הטיפול המינימלי הבא:

CLAMOX RTU

8.75 מ"ג/ק"ג משקל גוף (7.0 מ"ג אמוקסיצילין, 1.75 מ"ג חומצה קלולונית), שווה ערך ל-1 מ"ל / 20 ק"ג משקל גוף

24 שעות



8.75 מ"ג/ק"ג משקל גוף (7.0 מ"ג אמוקסיצילין, 1.75 מ"ג חומצה קלולונית), שווה ערך ל-1 מ"ל / 20 ק"ג משקל גוף

24 שעות



8.75 מ"ג/ק"ג משקל גוף (7.0 מ"ג אמוקסיצילין, 1.75 מ"ג חומצה קלולונית), שווה ערך ל-1 מ"ל / 20 ק"ג משקל גוף

במידת הצורך ניתן להזריק Clamox RTU למשך יומיים נוספים כדי לקבל משך טיפול כולל של 5 ימים

CLAMOX LC

מזרק אחד לכל רבע חולה

12 שעות



מזרק אחד לכל רבע חולה

12 שעות



מזרק אחד לכל רבע חולה

להבטחת המנה הנכונה, יש לקבוע את משקל הגוף בצורה מדויקת ככל שניתן כדי להימנע ממתן מנה קטנה מדי.

הנחיות לגבי אופן המתן הנכון

יש לנער היטב את הבקבוקון לפני השימוש. לאחר ההזרקה, יש לעסות את מיקום ההזרקה. יש להשתמש במחט ומזרק יבשים לחלוטין.

זמני המתנה

בקר: בשר ואיברים פנימיים: 42 ימים. חלב: 60 שעות.

חזירים: בשר ואיברים פנימיים: 31 ימים.

במקרה של טיפול משולב, ניתן לצרור את החלב בחלוף 60 שעות מהטיפול האחרון (לאחר 5 חליבות, אם הפרות נחלבות פעמיים ביום).

אמצעי זהירות מיוחדים בזמן האחסון:

יש להרחיק מהיגש ידם וטווח ראייתם של ילדים. אין לאחסן בטמפרטורה הגבוהה מ-25 מעלות.

יש להגן מפני אור. אין לשמור במקרר.

אין להשתמש במוצר התרופתי הווטרינרי בחלוף תאריך התפוגה, אשר מופיע על התווית. חיי מדף לאחר פתיחת האריזה המיידית לראשונה: 28 ימים.

אמצעי זהירות מיוחדים להשלכה:

אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה הביתית.

היעזר בתוכניות החזרת מוצרים כדי לסלק כל מוצר רפואי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או פסולת שמקורה במוצר בהתאם לדרישות המקומיות ולמערכות האיסוף הלאומיות שחלות על המוצר התרופתי הווטרינרי הנדון. אמצעים אלה אמורים לעזור להגן על הסביבה.

בקש מהווטרינר מידע לגבי אופן ההשלכה של תרופות שאין בהן עוד צורך.

סיווג המוצר התרופתי הווטרינרי

מוצר רפואי וטרינרי הכפוף למרשם.

גודלי אריזה

אריזה ראשונית

בקבוקוני פוליפרופילן x 50 מ"ל, 100 מ"ל, 250 מ"ל ו-500 מ"ל.

בקבוקוני זכוכית מסוג II בנפח 100 מ"ל ו-250 מ"ל, סגורים בפקק גומי ברומובוטיל מסוג I, ואטומים במכסה אלומיניום ובאטם פוליפרופילן מסוג "flip-off".

אריזה שניונית

קופסת קרטון בודדת של 50 מ"ל, 100 מ"ל ו-250 מ"ל. ייתכן שחלק מגודלי האריזות לא משווקים.

התאריך שבו נערך עלון האריזה לאחרונה

ינואר 2026

פרטי יצירת קשר

שם היבואן:

מיובא על ידי חברת MPVET בע"מ, פתח תקווה

שם היצרן:

CRIDA PHARM S.R.L., București, ROMÂNIA

מידע נוסף

