

# רומוקם RHEUMOCAM

## חומר פעיל: מלוקסיקם

תרופה אנטי דלקתית שאינה סטרואידלית, מעקבת 2-cox לטיפול בכאבים, הורדת חום, דלקות ואוסטוארטריטיס. לרומוקם ספיגה טובה במתן דרך הפה עם ובלי מזון. ניתן לשימוש (label extra) גם בחמוסים, מכרסמים, מעלי גרה, ציפורים וזוחלים. יש לנער את הסירופ לפני השימוש.

כמו nsaid's אחרים, יש להימנע מלתת במקרה של רגישות לתרופה ובבעלי חיים עם כיבים ודימומים במערכת העיכול. אין לתת לבעלי חיים המטופלים בסטרואידים. לא קיים מידע לגבי שימוש בכלבים מתחת לגיל 6 חודשים ובחתולים מתחת 4 חודשים. יש להשתמש בזהירות בבעלי חיים עם בעיות כבד, כליה ולב.

### מינון:

#### **כלבים:**

מינון ראשוני: 0.2 mg/kg  
פעם ביום (ביום הראשון לטיפול)

מינון להמשך הטיפול: 0.1 mg/kg  
פעם ביום (מהיום השני ואילך)

#### **חתולים:**

מינון ראשוני: 0.1- 0.2 mg/kg  
פעם ביום (ביום הראשון לטיפול)

מינון להמשך הטיפול: 0.05 mg/kg  
פעם ביום (מהיום השני ואילך)

\* בחתולים קיים גם פרוטוקול לטיפול חד פעמי של מלוקסיקם בהזרקה במינון 0.3 מ"ג/ק"ג - ללא המשך טיפול.